



SIMETICONA

GOTAS

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada 100 ml contiene: simeticona 4,000 g. Excipientes: hidroxipropilmetilcelulosa K 100 LV 1,250 g; hidroxietilcelulosa 0,500 g; sorbitol al 70% 18,000 g; glicerina 6,500 g; ácido cítrico anhidro c.s.p. pH 3,5-5,5, sucralosa 0,020 g; metilparabeno 0,120 g; propilparabeno 0,030 g; esencia de dulce de leche 0,010 g; clorhexidina gluconato solución al 20% 0,015 g; punzó 4R 0,300 mg; alcohol etílico 0,96 g%; agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acción Terapéutica: antiflatulento.

Indicaciones: tratamiento de los síntomas provocados por exceso de gas en el tubo digestivo.

Acción Farmacológica: la simeticona reduce la tensión superficial de las burbujas aéreas en el tubo digestivo facilitando su dispersión y por lo tanto su eliminación aliviando los síntomas secundarios al exceso de gas en el tracto gastrointestinal.

Farmacocinética: la simeticona actúa a nivel de la luz intestinal sin modificarse ni absorberse.

Posología - Modo de Administración

Niños mayores de 6 años: 15 a 20 gotas, después de las comidas y antes de dormir, eventualmente con un poco de líquido.

Niños menores de 6 años y lactantes: 10 a 15 gotas, dos a tres veces por día en la mamadera, o después de las comidas respectivamente.

Advertencias: Contiene 0,96% peso/volumen de alcohol etílico/etanol. No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

Contraindicaciones: ileo de cualquier etiología.

Precauciones: no posee.

Reacciones Adversas: no presenta.

Sobredosificación: aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

Presentación: envases con 30 ml.

Fecha de última revisión: julio de 2010

Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici - Farmacéutico.
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.
Certificado N° 30.125
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Boyacá 237 - Buenos Aires