

Venta Bajo Receta
Industria Argentina

Fórmula

Cada 100 ml contienen: simeticona 15,000 g. Excipientes: hidroxipropilmetilcelulosa K100 LV 0,150 g; hidroxietilcelulosa 0,550 g; glicerina 5,000 g; metilparabeno 0,170 g; propilparabeno 0,030 g; esencia de dulce de leche 0,010 g; clorhexidina gluconato solución al 20% 0,015 g; sorbitol solución al 70% 18,000 g; sucralosa 0,020 g; ácido cítrico anhidro c.s.p. pH 3,5-5,5, 0,060 g; alcohol etílico 0,960 g, agua purificada c.s.p. 100 ml.

Acción terapéutica: antiflatulento.

Indicaciones: tratamiento de los síntomas provocados por exceso de gas en el tubo digestivo. Preparación del tubo digestivo para procedimientos endoscópicos, radiográficos o ecográficos.

Acción Farmacológica: la simeticona reduce la tensión superficial de las burbujas aéreas en el tubo digestivo facilitando su dispersión y por lo tanto su eliminación aliviando los síntomas secundarios al exceso de gas en el tracto gastrointestinal.

Farmacocinética: la simeticona actúa a nivel de la luz intestinal sin modificarse ni absorberse.

Posología: modo de administración:

- 1) Preparación de estudios radiológicos abdominales:** 10 ml (1,5 g de simeticona) 2 a 3 veces por día, durante las 48 hs. previas al estudio.
- 2) Meteorismo y distensión abdominal postoperatoria:** 10 ml (1,5 g de simeticona) 2 a 4 veces por día por vía oral o por sonda nasogástrica.
- 3) Endoscopias digestivas:** los dos días previos tomar 10 a 20 ml dos veces por día. El día del estudio tomar 20 ml, por la mañana en ayuno o antes del estudio.

Advertencia: contiene 0,96% peso/volumen de alcohol etílico/etanol.
No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

Contraindicaciones: ileo de cualquier etiología.

Precauciones: no posee

Reacciones adversas: hasta el presente no se han descripto.

Sobredosificación: Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

Presentación: frascos conteniendo 60 y 150 ml.

Foma de conservación:

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Fecha de última revisión: julio de 2010

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici - Farmacéutico.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 26.533

Laboratorios CASASCO S.A.I.C
Boyacá 237 - Buenos Aires - Tel: (5411) 4633-3838
Contacto Comercial: info@casasco.com.ar

E-0051-05 / D0609 / Act. 04/2011