

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta - Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar ALERCAS y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada 5 ml de suspensión oral contiene: Fexofenadina clorhidrato 30,0 mg (equivalente a 28,0 mg de fexofenadina). Excipientes: poloxámero 407; glicerina; azúcar; esencia de Tutti Fruti; bióxido de titanio; sal disódica del ácido etilendiamintetraacético; metilparabeno; propilparabeno; propilenglicol; goma xántica; fosfato sódico monobásico monohidrato; fosfato sódico dibásico; agua purificada.

¿Qué es ALERCAS y para qué se usa?

ALERCAS Suspensión oral contiene fexofenadina clorhidrato, fármaco que pertenece al grupo de los antihistaminicos, que son medicamentos antialérgicos.

ALERCAS Suspensión oral se utiliza en niños de 2 a 11 años de edad para el alivio de los síntomas asociados a la alergia propia de la rinitis alérgica estacional, que se manifiesta con estornudos, goteo nasal acuoso, y picazón en nariz, paladar, garganta y ojos, con aumento de secreción lagrimal y taponamiento de la nariz. También se utiliza para el tratamiento de la urticaria crónica en niños de 6 meses a 11 años de edad.

Antes de usar ALERCAS
No use ALERCAS si

Si es alérgico a fexofenadina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Tenga especial cuidado con ALERCAS

Si tiene problemas con el funcionamiento del hígado o los riñones.

Toma simultánea de otros medicamentos

Comunique a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Los productos digestivos que contengan aluminio y magnesio pueden disminuir la cantidad de ALERCAS que se absorbe, por lo que se recomienda dejar un intervalo de 2 horas entre la toma de ambos productos.

¿Cómo usar ALERCAS?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

En rinitis alérgica estacional

Niños de 2 a 11 años: la dosis recomendada de ALERCAS Suspensión Oral es de 30 mg (5 ml de la suspensión) dos veces por día. Se recomienda 30 mg/día como dosis diaria inicial en pacientes pediátricos con disminución de la función renal.

En urticaria idiopática crónica

Niños de 6 meses a 11 años: la dosis recomendada de ALERCAS Suspensión Oral es de 30 mg (5 ml) dos veces por día para pacientes de 2 a 11 años de edad y 15 mg (2,5 ml) dos veces por día para pacientes de 6 meses a menos de 2 años de edad. Para los pacientes pediátricos con disminución de la función renal, las dosis iniciales recomendadas de ALERCAS Suspensión Oral son de 30 mg (5 ml) una vez por día para los pacientes de 2 a 11 años y de 15 mg (2,5 ml) una vez por día para los pacientes de 6 meses a 2 años de edad. Agitar bien el envase antes de utilizarlo.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

1

No tome ALERCAS si está embarazada a menos que sea absolutamente necesario. No se recomienda la toma de ALERCAS durante el periodo de lactancia.

Toma conjunta de ALERCAS con alimentos y bebidas

La toma de ALERCAS Suspensión oral con jugos de fruta (pomelo, naranja, manzana) disminuye la absorción del medicamento, y por lo tanto su efecto terapéutico.

Uso apropiado del medicamento ALERCAS
Si se olvidó de tomar ALERCAS

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Tome la dosis siguiente en su momento como le haya recetado su médico.

A tener en cuenta mientras toma ALERCAS
Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos asociados con más frecuencia en niños de 6 meses a 11 años de edad han sido dolor de cabeza, vómitos, tos, fiebre, infección del tracto respiratorio superior, diarrea, somnolencia, secreción nasal.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Cómo conservar ALERCAS?

- Conservar a temperatura menor a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 90 ml y 150 ml.

Si Ud. toma dosis mayores de ALERCAS de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosisificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777/ 0800-333-0160.
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247/ 0800-444-8694.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento no lo prescribo sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar

la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: marzo de 2018.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N° 48.720

Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

E-5903-01 / D6239 / Act.: 09/2023