

# Sinulcus<sup>®</sup>

## ESOMEPRAZOL 20 MG

**CASASCO**  
**Comprimidos recubiertos  
gastroresistentes**  
Vía de Administración: Oral  
Venta Libre  
Industria Argentina

### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.  
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

#### ¿QUÉ CONTIENE SINULCUS?

Cada comprimido recubierto gastroresistente contiene: Esomeprazol (como esomeprazol magnésico dihidratado 21,69 miligramos) 20,000 miligramos.  
Excipientes: hidroxipropilcelulosa; celulosa microcristalina; crospovidona; talco; estearato de magnesio; copolímero del ácido metacrilico / polimetacrilato; polisorbato 80; trietilcitrato; talco; dióxido de titanio; óxido de hierro amarillo.

#### ACCIÓN

Reduce la producción de ácido estomacal.

#### ¿PARA QUÉ SE USA SINULCUS?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

#### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR SINULCUS?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.  
No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.  
No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida;
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones;
- tiene diarrea prolongada o que no mejora;
- acidez desde hace más de tres meses;
- acidez con mareos o transpiración;
- dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello;
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- pérdida de peso inexplicable;
- dolor de estómago, náuseas o vómitos;
- trastornos renales y/o hepático.

Dado que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria, que requiera diagnóstico y tratamiento médico.

Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

**Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

#### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

- dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
- Erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Naproxeno asociado a Esomeprazol puede provocar trastornos renales graves (nefritis tubulointerstitial aguda que puede evolucionar a insuficiencia renal);
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Díazepam (medicamento sedante);
- Dígoxina (medicamento para el corazón);

1

**Comprimidos recubiertos  
gastroresistentes**

# Sinulcus<sup>®</sup>

## ESOMEPRAZOL 20 MG

**CASASCO**

- Teofilina (medicamento broncodilatador);
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores);
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH/SIDA);
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Esomeprazol.

#### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

**Es de administración oral en adultos mayores de 18 años.**

Tome un comprimido con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.  
No rompa ni mastique los comprimidos.  
No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.

**No tome por más de 14 días sin consulta médica.**

Si sus síntomas de reflujo empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

**Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.**

No se debe tomar esomeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

#### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

#### ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese al siguiente teléfono:  
ANMAT Responde: 0800 333 1234

**Mantener fuera del alcance de los niños  
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico**

**FORMA DE CONSERVACIÓN:** Conservar desde 15°C hasta 30 °C.

**Presentaciones:** envases con 14 y 20 comprimidos recubiertos gastroresistentes.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



Fecha de última revisión: Agosto 2024

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.  
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.  
Certificado N° 57.897  
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.  
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina